



בית חולים לשים
אשפוז יום נשים

מרכז רפואי רבין
RABIN MEDICAL CENTER
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
Tel Aviv University, Affiliated with the Sackler School of Medicine
בית חולים בילינסון • BEILINSON HOSPITAL

דף הסבר למטופלת לקראת גרידה/ היסטרוסקופיה אבחנתית

- פעולה זו כרוכה בהרחבה קלה של צוואר הרחם, צפייה בחלל הרחם (היסטרוסקופיה) ונטילת דגימה מרירית הרחם (גרידה)
 - פעולה זו מבוצעת בהרדמה כללית קצרה.
 - לאחר הפעולה צפויה תקופת התאוששות של 2-3 שעות. לאחר מכן תשתחררי לביתך.
 - תופעות צפויות (אך לא הכרחיות) של הפעולה:
 - כאב בטן תחתונה כתוצאה מהתכווצות הרחם.
 - דימום, בד"כ דימום קל, שיכול להימשך ב – 7-10 ימים.
 - עליך להיות במנוחה ביום הפעולה ויומיים נוספים פעילות קלה בלבד.
 - אם מופיעים כאבים עזים, הפרשה מוגלתית או עליית חום יש לפנות מיד לרופא מטפל.
 - תשובה של בדיקה הפתולוגית תגיע בדואר אל הרופא המטפל עד חודש ימים. יש לקבוע תור לביקורת אצל רופא/מטפל אחרי חודש ימים.
- בעת שהותך במחלקה ביחידתנו הרגשי נוח לפנות לשם הבהרה או הסבר נוסף.

בברכת החלמה מהירה!

צוות יחידת אשפוז יום