



בית חולים לנשים  
מחלקת נשים

מרכז רפואי רבין  
RABIN MEDICAL CENTER  
מוסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב  
Tel Aviv University, Affiliated with the Sackler School of Medicine  
בית חולים בילינסון • BEILINSON HOSPITAL

## הנחיות למאושפזת בשל הריון חוץ רחמי

### מטופלת יקרה,

הינך מאושפזת במחלקת נשים בשל אבחנה של הריון חוץ רחמי.

הריון חוץ רחמי הינו הריון שבמקום להשתרש במקומו הטבעי שהוא חלל הרחם הוא משתרש במקום כלשהו מחוץ לרחם. המקום השכיח ביותר למיקומו של הריון זה הוא החצוצרה.

הריון אשר נמצא מחוץ לרחם איננו יכול להתפתח ולהגיע למצב של הריון מתקדם מחד אך הוא יכול לפרוץ את האיבר בו הוא נמצא (בדרך כלל החצוצרה) ולגרום לדימום מסכן חיים מאידך. בשל עובדה זו אנו מטפלים בהריון חוץ רחמי כאשר אנו מאבחנים אותו.

ניתן לטפל בהריון חוץ רחמי ב 2 שיטות עיקריות:

#### הדרך הניתוחית:

בדרך זו מבצעים ניתוח בהרדמה כללית (ברוב המקרים לפרוסקופיה) שבמהלכו של הניתוח לרוב נכרתת החצוצרה בה מצוי ההיריון. יתרון השיטה הניתוחית הוא בסיום מהיר ויעיל של המחלה. חסרון שיטה זו הינה העובדה כי החולה נחשפת להליך ניתוחי על סיבוכיו וסיבוכי ההרדמה המתלווים אליו וכן שבסיומו נותרת האישה לרוב עם חצוצרה פעילה אחת בלבד.

#### דרך תרופתית:

מתן תרופה באופן סיסטמי אשר גורמת להפסקת התפתחותו של ההיריון המצוי מחוץ לרחם. הטיפול נקבע על פי מצבה של המטופלת, תשובת אולטרסאונד וערכי בטא בדם (לפחות 2 ערכים בטא בהפרש של 24 שעות).

בעת האשפוז חשוב מאוד להיות במנוחה ולדווח על כל שינוי בתחושה...