



**בית חולים לשים
אשפוז יום נשים**

מרכז רפואי רבין
RABIN MEDICAL CENTER
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
Tel Aviv University, Affiliated with the Sackler School of Medicine
בית חולים בילינסון • BEILINSON HOSPITAL

דף הסבר למטופלת לקראת תפר צווארי

מהו תפר צווארי?

תפר צווארי היא פעולה גניקולוגית שבה שמים תפר במקום הגבוה ביותר בצוואר הרחם, בד"כ התפר מושם בשבוע ה-14-12 להריון. הפעולה מתבצעת בחדר ניתוח בהרדמה כללית. משך ההשגחה לאחר הפעולה כשעתיים. לעיתים רחוקות יש צורך באשפוז ל-24 שעות.

הוראות לאחר הפעולה :

יש להימנע ביום הפעולה מ:

1. פעולה פיזית מאומצת.
2. נהיגה.
3. איסור קיום יחסי מין במשך שבועיים או לפי הוראת רופא.

תופעות לוואי אפשריות:

מדובר בפעולה פשוטה עם שיעור סיבוכים נמוך. דימום קל או אי נוחות בבטן תחתונה שכיחים אך בדרך כלל חולפים לאחר מספר שעות. הפרשות מוגברות מופיעות לעיתים, עליך לפנות לרופא המטפל. הפניה למיון נשים תתבצע במקרים הבאים:
עלית חום, תחושת צמרמורת, דימום שמתגבר, ירידת מים או כאבי בטן.
בעת שהותך ביחידתנו הרגישי נוח לפנות לאחיות לשם הבהרה או הסבר נוסף.

בברכת החלמה מהירה!

צוות יחידת אשפוז יום