

הנחיות לטיפול ב –LASER (לייזר) בצוואר הרחם.

**אנא קראי את ההנחיות בתשומת לב לפני לכתך הביתה.
לשאלות או הסברים נוספים פני לאחיות בעת שהותך ביחידה.**

מיד לאחר הפעולה תיתכן תחושת כאב או לחץ בבטן התחתונה למשך מספר שעות. ניתן להשתמש בתכשירים נוגדי כאב המקובלים עליך, במידת הצורך.

בימים הראשונים לאחר הפעולה יכולה להופיע הפרשה כהה (עד שחורה). הפרשה זו יכולה להופיע עם או בלי דימום, ולהמשך מספר ימים ועד שלושה שבועות.

במידה והופיע דימום חזק, כמו וסת או יותר, יש לפנות לרופא המטפל או לחדר מיון נשים.

הימנעי משימוש בטמפונים, השתמשי בפדים בלבד עד לביקורת הראשונה.

הימנעי מפעילות גופנית מאומצת כגון: התעמלות, ריקודים, רכיבה על אופניים, למשך 3 שבועות.

אין להתרחץ בבריכת שחייה, ז'קוזי ומקווה במשך 3 שבועות.

הימנעי מקיום יחסי – מין במשך 6 שבועות.

מחזור הווסת הקרוב עלול להיות בלתי סדיר – להקדים או להתאחר, ארוך או קצר מהרגיל.

עלייך לעבור ביקורת אצל הרופא המפנה תוך 4-6 שבועות מיום הפעולה.

התייעצי עם הרופא המפנה לגבי הצורך בבדיקת בן הזוג.

בברכת החלמה מהירה מצוות היחידה.